

ROŚLINY WIELOLETNIE UPRAWIANE JAKO JEDNOROCZNE I WYMAGAJĄCE PRZECHOWYWANIA ZIMĄ POD OSŁONAMI

asteriskus
bakopa
begonia bulwiasta
bieluń
chryzantema drzewiasta
dipladenia 'Sandaville'
fuksją mieszańcowa

gnafalium, kocanki włochate
heliotrop peruwiański
irezyna Herbsta
koleus Blumego
lantana pospolita
pelargonia bluszczolistna
plektrantus koleusowaty

scewola
wilczomlecz 'Diamond Frost'
werbena (odmiany wiszące
do pojemników)
zielistka Sternberga

GATUNKI PNĄCE I WIJĄCE SIĘ

dipladenia
fasola wielkokwiatowa
grozdek pachnący

kobea pnąca
nasturcja włóczęga
rodochiton

tunbergia oskrzydłona
wilec purpurowy

PACHNĄCE GATUNKI JEDNOROCZNE I CEBULOWE

bazylia pospolita
bieluń
dziwaczek Jalapa
grozdek pachnący
heliotrop krzewiasty
hiacynt wschodni

konwalia majowa
lantana
lewkonia
lilia
narcyz
ogórecznik

plektrantus koleusowaty
pustynnik
smagliczka nadmorska
tulipan
tytoń (Sandera, oskrzydłony)



Bratki i kocanki włochate posadzone w starym kamiennym pojemniku dopełniają się kolorystycznie.



Objaśnienia symboli



ozdobne
liście



wysiew nasion
do gruntu



ozdobne
kwiaty



cebule do
wykopania




cebule zimujące
w gruncie



sadzenie
rozsady

Katalog



Agapant

Agapanthus

Rodzina: agapantowate (*Agapanthaceae*)

WYSOKOŚĆ: 50-90 cm.

KWITNIENIE: VII-IX.

KWIATY: Białe lub niebieskie, zebrane w główkowate grona na wysokich szypułkach.

ORGANY PODZIEMNE: Grube kłącze z mięsistymi korzeniami. Może wymarzać. Zagony należy okryć na zimę ściółką lub kłaczka wykopać i przechować w temp. 2-5°C przykryte torfem lub trocinami.

TERMIN SADZENIA: Wiosną po podziale kłaczy (koniec IV-V).

ROZMNAŻANIE: Podział dużych kłaczy.

STANOWISKO: Zacisne, słoneczne, gleba żyzna, wilgotna, ale nie podmokła. Należy obficie podlewać i nawozić.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Roślina efektowna w dużych jednorodnych grupach lub w pojemnikach.



Begonia bulwiasta

Begonia x tuberhybrida

Rodzina: ukośnicowate (*Begoniaceae*)

WYSOKOŚĆ: 25-35 cm, są też odmiany wiszące.

KWITNIENIE: V-X.

KWIATY: Różnobarwne, różnej wielkości, brzegi gładkie lub fryzowane.

ORGANY PODZIEMNE: Duża spłaszczona bulwa pokryta skórą. Należy je wykopywać i przechowywać w temp. 8-10°C.

TERMIN SADZENIA: III-IV do doniczek, po przymrozkach do gruntu lub pojemników.

ROZMNAŻANIE: Przez podział wiosną, II-III podział dużych kłaczy lub siew nasion.

STANOWISKO: Półcieniste, zacisne i wilgotne. Doskonała roślina do pojemników, a odmiany wiszące – do skrzynek balkonowych o wystawie północnej.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Roślina wyjątkowo wartościowa i popularna dzięki długiemu kwitnieniu.



Błonczatka, ismena

Hymenocallis

Rodzina: amarylkowate (*Amarylidaceae*)

WYSOKOŚĆ: 35-40 cm.

KWITNIENIE: VII-VIII.


KWIATY: Białe, z oryginalnie powyginanymi wąskimi płatkami i dużym przykoronkiem, pachnące.

ORGANY PODZIEMNE: Duża cebula osłonięta suchą łuską. Wymaga wykopywania i przechowywania w temp. 12-15°C pod przykryciem z torfu lub trocin.

TERMIN SADZENIA: IV-V.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych.

STANOWISKO: Słoneczne, zaciszne, gleba żyzna, wilgotna. Może być uprawiana w pojemnikach.



Cantedeskia kolorowa

Zantedeschia, mieszańce *Z. ellottiana*,
Z. rehmanii

Rodzina: obrazkowate (*Araceae*)

WYSOKOŚĆ: 60-100 cm.

KWITNIENIE: VII-VIII.

POCHWY KWIATOSTANOWE: Na wzniesionych szypułach, kielichowate, duże, różnobarwne.

ORGANY PODZIEMNE: Kuliste, spłaszczone kłącze. Wymagają wykopywania i przechowywania w temp. 9-12°C.

TERMIN SADZENIA: IV-V.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie fragmentów kłącza przed sadzeniem.

STANOWISKO: W półcieniu, na żyznej, wilgotnej, dobrze zdrenowanej glebie. Komponuje się w dużych grupach na tle ciemnozielonych krzewów.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Dekoracyjne, nakrapiane liście.



Cebulica Tubergena

Scilla mischtsenkoana, syn. *S. tubergeniana*

Rodzina: hiacyntowate (*Hyacinthaceae*)

WYSOKOŚĆ: 10-15 cm.

KWITNIENIE: III.

KWIATY: Biało-niebieskie, dzwonkowate.

ORGANY PODZIEMNE: Cebula osłonięta suchą łuską, zimotrwała.

TERMIN SADZENIA: IX – pocz. X.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych.

STANOWISKO: Ma niewielkie wymagania. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu na lekkiej glebie. Dobrze się prezentuje na skraju rabat, w pobliżu krzewów lub wokół niewielkich drzew. W sprzyjającym miejscu, np. na trawniku z rzadką trawą, tworzy efektowne kobierce.

GATUNKI: Cebulica syberyjska (*S. sibirica*) – kwiaty szafirowo-niebieskie.



Czosnek olbrzymi

Allium giganteum

Rodzina: czosnkowate (*Alliaceae*)

WYSOKOŚĆ: 40-70 cm.

KWITNIENIE: V-VI.

KWIATY: Duże, dekoracyjne kuliste kwiatostany na długich szypułach. Pojedyncze kwiaty gwiazdkowate: białe, lila, niebieskie, purpurowe, fioletowe, żółte. Stosowane czasem na kwiaty cięte. Długo stoją w wazonie.

ORGANY PODZIEMNE: Cebula osłonięta suchą łuską, zimotrwała.

TERMIN SADZENIA: IX – pocz. X.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych lub siew nasion po ich dojrzeniu.

STANOWISKO: W pełnym słońcu na ciepłej, przepuszczalnej glebie. Niskie gatunki i odmiany efektownie wyglądają sadzone grupami na skalniakach, średnie na wielogatunkowych rabat, a najwyższe są idealne jako solitery.

GATUNKI: Niskie do 30 cm: czosnek karatawski (*A. karataviense*), czosnek neapolitański (*A. neapolitanum*), czosnek złocisty (*A. moly*); wysokie, 40-70 cm: czosnek Krzysztofa (*A. christophii*), *A. caeruleum*, czosnek główkowaty (*A. sphaerocephalon*), czosnek Szuberta (*A. schubertii*).



Czosnek sztyletowaty

Nectarosicordium sicculum

Rodzina: czosnkowate (*Alliaceae*)

WYSOKOŚĆ: 40-60 cm.

KWITNIENIE: V-VI.

KWIATY: Dzwonkowate, zielonkawo-purpurowe, zebrane w luźne kwiatostany; wydzielają słodki nektar.

ORGANY PODZIEMNE: Cebula osłonięta suchą łuską, zimotrwała.

TERMIN SADZENIA: IX – pocz. X.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych, siew nasion po ich dojrzewaniu.

STANOWISKO: W pełnym słońcu na cieplej, przepuszczalnej glebie.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Efektowne na wielogatunkowych rabatach.



Dalia

Dahlia

Rodzina: astrowate (*Asteraceae*)

WYSOKOŚĆ: Od 30 cm (odmiany karłowe) do 120 cm.

KWITNIENIE: VII-IX.

KWIATY: Różnobarwne, różniące się budową (pojedyncze, półpełne, peoniowe, pomponowe, kaktusowe itp.). Dalia pomponowe i kaktusowe nadają się na kwiaty cięte.


ORGANY PODZIEMNE: Karpy z licznymi bulwiastymi korzeniami. Wymagają wykopywania i przechowywania w temp. 5-10°C, lekko przykryte piaskiem.

TERMIN SADZENIA: Pocz. V do gruntu lub wcześniej do doniczek.

ROZMNAŻANIE: Przez podział karp IV-V.

STANOWISKO: Słoneczne, gleba żyzna. Na słabym stanowisku wymaga nawożenia i podlewania. Odmiany karłowe idealnie się nadają do pojemników i na obwódki, niskie – na kwietniki, rabaty, do skrzynek i mis, a średniowysokie i wysokie – do tworzenia grup ogrodowych, osłon, na wyższe partie rabat.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Kruche pędy, szczególnie odmian wysokich, w czasie kwitnienia trzeba podwiązywać do palików.



Galtonia biaława, hiacynt letni

Galtonia candicans

Rodzina: hiacyntowate (*Hyacinthaceae*)

WYSOKOŚĆ: 1-1,2 m.

KWITNIENIE: VII-VIII.

KWIATY: Duże, białe, dzwonkowe, osadzone na długim, okazałym pędzie.

ORGANY PODZIEMNE: Duża cebula osłonięta suchą łuską.

Wymaga wykopywania i przechowywania w temp. 12-15°C.

TERMIN SADZENIA: IV.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych wczesną wiosną lub z nasion.

STANOWISKO: Słoneczne, gleba żyzna, wilgotna. Pięknie wygląda sadzona w dużych grupach na tle ciemnozielonych krzewów.



Hiacyntik hiszpański, endymion, cebulica hiszpańska

Hiacynthoides hispanica

Rodzina: hiacyntowate (*Hyacinthaceae*)

WYSOKOŚĆ: 30-40 cm.

KWITNIENIE: V-VI.

KWIATY: Fioletowoniebieskie, niebieskie, białe, różowe, dzwonkowe, zebrane po osiem-dziesięć w kłosowate grona.

ORGANY PODZIEMNE: Cebula osłonięta suchą łuską, zimotrwała.

TERMIN SADZENIA: X-XI.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych.

STANOWISKO: Słoneczne lub półcieniste, ciepłe, gleba przepuszczalna i zasobna. Dobrze wygląda na wielogatunkowych rabatach. Nadaje się na kwiaty cięte.